

NPLATE® (ROMIPILOSTIM)-ONDERLEGGER

U moet geoefend hebben met uw zorgverlener voor u romiplostim mag toedienen.

Voordat u begint

- Lees zorgvuldig alle gebruiksinstructies.
- U moet een strak behandelprogramma aanhouden, ook wanneer u op reis bent.
- Zorg ervoor dat u beschikt over alle benodigdheden (zie onderstaande afbeeldingen).
- Controleer de houdbaarheidsdata op alle injectieflacons.
- Gebruik de injectieflacons niet als de houdbaarheidsdatum is verstreken of als de injectieflacons langer dan **30 dagen** bij kamertemperatuur hebben gestaan.
- Was uw handen met zeep.
- Gebruik een alcoholdoekje om het oppervlak te reinigen waarop u het middel klaarmaakt.

OPMERKING

Gebruik deze onderlegger samen met de *Stappengids* en/of de bijsluiters om uw injectie met romiplostim klaar te maken. Mogelijk moet u meer dan één injectie van romiplostim toedienen. Als uw arts tegen u heeft gezegd dat u meer dan één injectie met romiplostim moet toedienen, doorloop dan de stappen zoals aangegeven in de *Stappengids* om aan uw voorgeschreven dosis van het middel te komen met gebruikmaking van (een) nieuwe set(s) voor zelfinjectie.

Zorg ervoor dat u de onderstaande benodigdheden bij de hand hebt voor u begint.

A Injectieflacon met het poeder (1)



B1 Zuiger (1)



B2 Met steriel water gevulde injectiespuit (1)




C Wegwerpspuit van 1 ml met Luer lock (1)



D Veiligheidsnaald: 27 G, 13 mm (1)



E Flaconadapter (1)



F Verpakkingen met alcoholdoekje (4)



G Naaldencontainer (1; niet meegeleverd)



OPMERKING: deze afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.

Bewaar de injectieflacons met het poeder tot gebruik in hun verpakking ter bescherming tegen licht. Dit geneesmiddel mag uit de koelkast worden genomen voor een periode van maximaal 30 dagen bij kamertemperatuur (maximaal 25 °C). Uw zorgverlener kan een andere naald voor injectie adviseren.

UW WERKOPPERVLAK